Verschiedene Aquarien mit Seemandelbaumrinde
 Beigesteuert von Marco Rainolter aus Langenthal
Mittwoch, 29. April 2009

Ich habe SMBR in drei Becken.
Bevor ich die Rinde in die AQ's gab, habe ich sie kurz mit brühendem
Wasser übergossen und 2min "ziehen" lassen. Danach direkt ins AQ.
Die erst sank bereits nach etwas mehr als 2h, bei den anderen dauerte
es zwischen 12h und 14h (die im Kafi-Becken habe ich jedoch im Sand
eingegraben).
Nr. 1: 3g SMBR
Besatz: 8 Guppy (in der Zwischenzeit noch ca. 10 Junge), RF und Tiger Garnelen
Pflanzen: Moosballen, Eleocharis acicularis, Nesaea spec. Bacopa
Amplexicaulis, Vallisneria Torta, Limnophila Sessiliflora,
Spathiphyllum wallisii, anubias nana (glaubs), farnartige Pflanze,
Cryptocoryne, Windelov, Nixkraut & Wasserlinsen
WW: 112l, pH 7,6, KH6, GH>10 > jede Woche ca. 1/3 WW mit Easylife ProFito/Carbo
Nr. 2: 3g SMBR
Besatz: Radar-, White Pearl und Bienen Garnelen
Pflanzen: Wendelov, Moosballen, Lysimachia nummularia aurea,
Cratonneuron filicinum, Stringy Moos, Fissidens fontanus, Sagittaria
subulata, Nixkraut & Wasserlinsen
WW: ca. 96l, pH 7,6, KH6, GH>10 > jede Woche ca. 1/3 WW mit Easylife ProFito/Carbo
Nr. 3: 2g SMBR
Besatz: 1 Kafi & ein paar Nashorngarnelen
Pflanzen: Wasserpest, Wasserlinsen, anubias nana, Riccardia
chamedryfolia, Stringy Moos, Vallisneria Torta, Sagittaria subulata,
Cryptocoryne, Windelov, div. Moose
Beobachtungen:
-Die Garnelen stürzten sich natürlich immer gleich als erste auf die
Aspi\'s Wasserchemie
http://www.wasserchemie.ch
Powered by Joomla!
Generiert: 7 September, 2010, 02:31

Rinden. Auch die Guppys picken gelegentlich dran. Denn Kafi
interessiert die SMBR nicht (wenn sie im Boden steckt...).

- In Becken Nr. 1 hat sich das Wasser nur in den ersten 4 Tagen etwas
verfärbt, nach dem 1. WW war kaum mehr etwas von der Färbung sichtbar.
In Becken Nr. 2 hat sich das Becken mehr verfärbt - auch nach mehreren Wochen ist das Wasser immer noch leicht
gefärbt.
Im Becken Nr. 3 mit dem Kafi kann ich keine (oder nur seeehr schwache) Verfärbung erkennen.
- Der Kafi hatte zwei Tage nach einsetzen der SMBR eine "Schürfwunde"
oberhalb des einen Auges. Diese verheilte rasch - bereits nach 5 Tagen
war nichtsmehr sichtbar...
- Bei den Guppys wie auch bei den Garnelen, gab es in den letzten Wochen fleissig Nachwuchs & es sind alle wohl auf...
- WW stabil - in Becken Nr. 2 hat sich der PH offenbar etwas gesenkt (genau messen kann ich jedoch nicht - nur
Streifentest)
Vorteile SMBR gegenüber SMBB:
- klein, braucht nicht viel Platz resp. versperrt nicht die Sicht im/ins AQ
- länger stabil im Wasser, zerfällt sehr langsam (Vor- & Nachteil)
- kann leicht entfernt oder verschoben werden
"Nachteile":
- Naturprodukt > folglich ist jede Rinde etwas anders beschaffen -
eine "garantierte Färbung des Wassers" scheint es nicht zu geben - was
ja aber nichts über die Wirkstoffe aussagt
- die Garnelen können die Rinde weniger gut "anknabbern" - bei SMBB ist dies einfacher
Ich denke, ich werde in Zukunft immer SMBR im AQ haben. Damit die
Garnelen trotzdem etwas "Leichtes" zum Knabbern haben, gibts ja auch
noch die Laubblätter aus den heimischen Wäldern
Beim Kafi-Becken werde ich wohl noch etwas mehr als 2g hineingeben, evtl. färbt sich das Wasser ja dann etwas mehr
Auf die Wasserqualität & somit auch auf das Befinden der Tiere, scheint die SMBR nur positive Effekte zu haben.
Aspi\'s Wasserchemie
http://www.wasserchemie.ch
Powered by Joomla!
Generiert: 7 September, 2010, 02:31